Zibebe bleu

Vass8R01s176-180




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1234

dantadantadantadantad

op xot ito alen

Zibèbe blen 8 R 1 s-176-180







dantadantadantadantad

CLOS 8 RANG 1 Souche 176-180
Désignation : 2 Dels Deux
CHARGE: Année :
Véraison : 28:7
Maturité : 5:9:88

Mill.: O Pour.: 05 +3

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 14

L - M - C

Viyueur : 35
PORT : Frig - 1/2 érig - couché
SALE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 2 |

disc. - Sph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

S1 9 2 Avec pépins - apyrène
S3 1 1 JUS : inc. - coloré
S4 1 1

<u> Luntuuluutuuluutuuluutuuluutuul</u>

ANNEE 1988 NOM Zibebe bleu n EMPLACEMENT & R1 176-180

	1 7 1 1 1 1 1 1	P	-		,							,
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 &	4	91.3	25,3	2								
3 8			0.5		5	25.5	31.5	3.6	28.7	1.8	4.8	5.9.88
4	4	21.3	25.3	1								
5	4	19.3	21.3	h								
-	1	Pourrit	ure :0	5	Port :	erige'	Vig	ueur	:3,5 bo	une		
			24,3				31.5			+2		+3
			0				0					

dintindustralinitindustral

mi :

ANNEE 1989 NOM Zibebe bleu EMPLACEMENT 8 R 1 176-180

m

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
2 3 4	300	203 203 203	233 · 233 ·	0	2,0	18.5	22.5	24.5	31,7	7.8	Mi8	4,9
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Couche Vigueur: 4,5												

ANNEE 1990

NOM

Zibele bleu

EMPLACEMENT 8 R1 1 176 - 180

dintadantadantadantad

4			
1			
m	_	_	
me	5		

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
3 4 5	5 4	1.3	15,3. 15,3. 15,3. 15,3.	2 5	8	16.5	17,5	18:5	2317	307 +3	7,8	10.990
Pourriture : 0				Mill.	0	Port :			V	igueu	r :	

N° d'ordre : Zibebe bleu Cl 8 R 1 a 176-180 (6.176) (A) BOURGEONNEMENT Désignation : Emplacement : Epanoui 182) - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux (189 - duveteux (189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279. Blanc 191 - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (98) (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT Eta(é)s - en gouttière - autres. Pace inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéenses (202) - duveteuses (203) - cotonneuses 204 - dans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse (2000) Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - (à plages bronzées ou cuivrées 21) entièrement bronzées ou caivrées 211 - vertes 217 - autres 213. (Dans le cas cù la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ême et de la 3ême feuille détachées sera notée). (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Face inférieure Mervures : glabre 214 - séteux 715 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (83) Limbe: glabra 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (2) - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 sans villosité laineuse (1). A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté Face supérieure Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 (à plages bronzées ou cuivrées 231/ - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233. A péticle glabre 234 - séteux 265 velouté 236 - aranéeux 23762 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 18 Totalement - sillon - partiellement.

nhantanhantanhantanhantanh

Calvo 87

M' d'ordre: Zibèbe ble

Désignation : Emplacement : Zilièbe blen 8 R 1 s. 176-180 (s.146)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 289 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte, courte - moyenne à longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 et vert 265000

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Désignation:

Zibèbe blen

8 R 15-176-180 (176)

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux (45) - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité

laineuse 2/3.

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux (53) - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2 - sans villosité
laineuse 2/75.

dantaalaataalaataalaataal

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161) faifais

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (7) - court 172.

Glabre (73) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré (77) - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo87

Zilièle bleu 8 R 1 s - 176 - 180 (s.1) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE Grosse 68 - Moyenne (9)- Petite 70 (dimensions 14x). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (13.) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (78) aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 20 x). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (91) Très pruinée \$2 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régullère - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 66 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (67) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 113. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 109 - moyen 129 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (2) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129 A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pégins - apyrène.

dantadantadintadantad

Calvo 87

Zibebe bleu 8 R 1 s 176. 180(s.1)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Unnimi mili

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9). Surface

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

dantadantadantadantad

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) . saillant (1) - efface (2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo88

N° d'ordre :
Désignation : Zibebe bleu
Emplacement : 8 R1 A 176 - 180

Junton lunto

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
Sexe
                                        : (7 - 8 - 9
L_1/L_2
L2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                          : 40 - 41
 Dents : forme
                                        : 42 - 43 - 44
 Dents (angle)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües